ACM-Amino 24

Acides Aminés

Groupe 4.1.01 conformément le décret AAA/2564/2015, du 27 de Novembre, modifiant les annexes I, II, III, IV y VI, du R.D. 506/2013, du 28 de Juin, sur les produits d'engrais

AMINOGRAMME

Acide aspartique, Thréonine, Arginine, Alanine, Cystéine, Acide glutamique Tyrosine (52,8%), Serine, Histidine, Glycine, Valine, Methionine, Phenylalanine, Isoleucine, Leucine, Lysine (28%), Proline

CARACTÉRISTIQUES

ACM-Amino 24 est un produit liquide avec une haute concentration d'acides aminés obtenus par la fermentation (Corynebacterium s.p.) de protéines végétales. Il favorise la croissance et le développement végétatif. Il joue un rôle de transporteur. Il agit en situation de stresse de la plante.

Il est recommandé pour toutes les cultures et en particulier dans les sols pauvres en matière organique.

DOSE D'APPLICATION



ARBRES FRUITIERS ET AGRUMES

Foliaire: 100 - 150 cc./Hl.
Irrigation: 1 – 2 L/Ha.

Dose:
3 à 5 applications au printemps.



LÉGUMES, POMMES DE TERRE ET FRAISES

Foliaire: 100 - 150 cc./Hl.
Irrigation: 2 – 3 L/Ha.

Dose:
Du repiquage jusqu'à les premières récoltes.



OLIVE

Foliaire: 150 - 250 cc./Hl.
Irrigation: 2 -4 L/Ha et application.

Dose:
2 à 3 applications au printemps et 1 en automne.



BANANA ET SUBTROPICALES

Foliaire: 10 - 1.500 cc./Hl.
Irrigation: 1 – 3 L/Ha.

Dose:
3 à 5 applications durant le cycle.

COMPOSITION
exprimés en % p./p.

Acides Aminés libres: 24%
Azote (N) total: 6%
Azote organique: 4.3%
Azote ammoniacal: 1,7%
pH: 6,5
Densité: 1,20 g/cm^3
Couleur: Noir

ZÉRO RÉSIDU

PRÉCAUTIONS

Les recommandations et les informations que nous fournissons, sont le résultat des larges et rigoureux essais. Cependant, des nombreux facteurs peuvent influer sur notre contrôle l'heure de sa utilisation tel que la météo, la préparation des bouillons, les applications, etc. La société garantit la composition, la formulation et le contenu. L'utilisateur est le responsable des dommages causés (manque d'efficacité, de toxicité, des déchets, etc.), pour ne pas suivre les instructions de l'étiquette. Ne pas mélanger avec des huiles. Ne pas dépasser la dose de 200cc/Hl l'heure de le mélangé avec le soufre ou les correcteurs de carence en application foliaire. Faire attention l'heure de le mélanger avec des produits cupriques, effectuer un essai préalable sur la culture à traiter et observer les réactions qui peuvent se produire. Ne pas appliquer en prunier en raison du risque de phytotoxicité. Conserver dans un lieu sec et à l'abri des températures extrêmes (5 °C-35 °C). Tenir hors de portée des enfants. Maintenir à l'écart de la nourriture, des boissons et aliments pour animaux. En cas de contact avec les yeux et la peau, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau.

© Agroconsulting del Mediterráneo | Département technique | info@agroconsulting.es | + (00) 34 961 668 120 | Rev. 1 (21/01/16)