ACM-Aminograin

Acides Amines.Micronutriments. Groupe 4.1.01
ORDRE AAA / 2564/2015, du 27 Novembre, modifiant les annexes I, II, III, IV et VI R. D. 506/2013, du 28 Juin, sur les produits d´engrais

AMINOGRAMME

L'acide aspartique, la thréonine, l'arginine, l'alanine, la cystéine, l'acide glutamique Tyrosine: 50%, la sérine, l'histidine, la glycine, la valine, la methionine, la phenylalanine, l'isoleucine, la leucine, la lysine, la proline.

CARACTÉRISTIQUES

ACM-Aminograin aide à surmonter les périodes de stress, l'amélioration de la croissance végétative et la fructification. Il augmente la production et la qualité de la fibre. Il réduit l'effet négatif des traitements herbicides. Il augmente la production et la qualité du grain et empêche la réduction de la croissance végétative provoquée par l'herbicide. Il stimule aussi la croissance et le développement végétative.

DOSE D'APPLICATION



COTON

Dose:
1–1,25 L/Ha.

21 jours après avoir enlevé le couvercle en plastique. Au début de la floraison et de la formation de la capsule.



RIZ ET CACAO

Dose:
1–1,50 L/Ha.

Riz. Dans la phase de contrôle. A la pré-floraison. Appliquer les traitements avec des herbicides ou des fongicides.

Cacao. Au moment de maximum croissance végétative.



AVOINE, BLÉ ET LE SEIGLE

Dose:
1–1,25 L/Ha.

En combinaison avec des herbicides, des insecticides et des fongicides. Au début de la floraison.



MAÏS, TOURNESOL ET LE SORGHO

Dose:
1–1,55 L/Ha.

Appliquer à l'étape de 2-4 feuilles. Répéter comme étape précédente quand il et on a entre 6 et 8t feuilles. Au début de la floraison.

COMPOSITION
exprimés en % p./p.

Acides aminés libres d'origine végétale: 8%
Azote (N) total: 5%
Azote organique: 2,5%
Azote amoniacal: 2,5%
Bore (B): 0,1%
Fer (Fe): 0,1%
Manganèse (Mn): 0,45%
Cuivre (Cu): 0,1%
Zinc (Zn): 0,30%
Molybdène (Mo): 0,02%
pH: 5-6
Densité: 1,20 g/cm^3
Couleur: Brun foncé

ZÉRO RÉSIDU

PRÉCAUTIONS

Les recommandations et les informations que nous fournissons, sont le résultat des larges et rigoureux essais. Cependant, des nombreux facteurs peuvent influer sur notre contrôle l'heure de sa utilisation tel que la météo, la préparation des bouillons, les applications, etc. La société garantit la composition, la formulation et le contenu. L'utilisateur est le responsable des dommages causés (manque d'efficacité, de toxicité, des déchets, etc.), pour ne pas suivre les instructions de l'étiquette. Conserver dans un endroit t sec et à l'abri des températures extrêmes (5 ° C-35 ° C). Tenir hors de la portée des enfants. Maintenir à l'écart de nourriture, des boissons et des aliments. En cas de contact avec les yeux et la peau, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau.

BIOSTIMULANTS | CORRECTERUS DES CARENCES | CONDITIONNEUR DU SOL | SUBSTANCES DE BASE | AUTRES PRODUITS