ACM-Equisetum

agro consulting del mediterráneo s.l.

Substance de base: Equisetum Arvense L. Conformément à l'article 23 du règlement CE 1107/2009. Règlement d'exécution (UE) nº 462/2014 de la Commission du 5 de Mai de 2014

CARACTERISTIQUES

ACM-Equisetum est un extrait d'equisetum arvense L., qui agit comme stimulateur de mécanismes de défense naturels, assurant une protection de base pour les cultures. **ACM-Equisetum** est considérée comme une aide à la santé des plantes de la culture. Sa formule se base sur des principes naturels, elle a un avantage dans la gestion des champignons foliaires. Le produit est une formulation dont le principe actif incorpore une large gamme de principe actif sous la forme des sels minéraux; en particulier les dérivés de l'acide silicique et les compostes solubles dans l'eau dérivés de silice, d'acides phénoliques (caféique gallique), de flavonoïdes (quercétine et de l'isoquercitrine et d' equisetrine) et des tanins etc. qu'ils stimulent les défenses naturelles de la plante. Ces principes actifs sont stabilisés au sein de la matrice du produit naturel, ce qui confère une grande stabilité et efficacité. **ACM-Equisetum** agit sur la sporulation et l'infection des mildious, moucheté et alternaria.

Les composés végétaux utilisés dans **ACM-Equisetum** présentent un large spectre avec une forte activité antimicrobienne. **ACM-Equisetum** est une clé unique pour contrôler les programmes de diverses maladies fongiques de type: Venturia inaequalis, vin Plamospara, Erysiphe necator, Podosphaera leucotricha, deformans Taphrina et Septoria lycopersici dans les cultures comme la pomme, la pêche, la vigne, le concombre, la tomate, etc.

- Il a un effet préventif élevé et une action curative marquée.
- Il dénature les structures infectieuses de fongus.
- Il active les mécanismes de défense des plantes.

La préparation d'**ACM-Equisetum** se fait par macération et décoction subséquente de la partie aérienne.

DOSE

Les conditions d'utilisation on étés approuvées le 20 Mars 2014 en Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale (SANCO / 12386/2013) Rev. 5:



ARBRES FRUITIERS (Pomme, Poires y pêchers)

Maladie:
Roya (Venturia inaequialis), **Oidium** (Podosphaera leucotricha) et **Lèpre** (Taphrina deformans)
Dose:
0,2 l/Hl; 2 L/Ha.
Commencer les applications foliaires au début du bourgeonnement avec les conditions environnementales favorables pour le développement de la maladie.
4 applications chaque 7 jours pendant la culture.



VIGNE

Maladie:
Oidium (Erysiphe necator) et **Mildius** (Plasmopara vitícola)
Dose:
0,2 l/Hl; 2 L/Ha.
Commencer les applications foliaires au début du bourgeonnement avec les conditions environnementales favorables pour le développement de la maladie.
2 - 6 applications chaque 7 jours pendant la culture.
L'utilisation du bouillon serait de 500 L/Ha.



CUCURBITACÉES (Citrouilles, courges, melon, concombre, pastèque)

Maladie:
Oidium et **Phytium** (Podosphaera xhantii)
Dose:
0,2 l/Hl; 2 L/Ha.
L'application foliaire pour oídium est: 2 applications chaque 3 - 4 jours.
Application à la racine pour les maladies des racines et des semis: 2 applications chaque 3 - 4 jours.
Intervalle minimum pré-récolte: 15 jours.



TOMATE

Maladie:
Alternaria et **Septoria Podredumbre**
Dose:
0,2 l/Hl; 2 L/Ha.
Appliquer dès les premières inflorescences visibles, l'heur des conditions environnementales favorables au développement de la maladie.
Deux applications chaque 14 jours.
Minimum intervalle pré-récolte: 15 jours.

COMPOSITION

exprimés en % p./p.

Extrait d'Equisetum Arvense L.: 2 g/l
Densité: 1,25 g/cm³
pH: 5-6
Aspect: Substance concentrée brun noirâtre

ZÉRO RÉSIDU

PRÉCAUTIONS

Les recommandations et les renseignements fournis sont le résultat des larges et rigoureux essais. Cependant, des nombreux facteurs peuvent influer sur notre contrôle l'heure de sa utilisation tel que la météo, la préparation des bouillons, les applications, etc. La société garantit la composition, la formulation et le contenu. L'utilisateur est le responsable des dommages causés pour la manque d'efficacité, toxicité, déchets, etc..en cas de ne pas suivre les instructions de l'étiquette. Il faut l'appliquer avec un maximum de 24 heures depuis sa préparation pour empêcher l'oxygénation du produit et la contamination microbienne pendant le stockage. Conserver dans le récipient d'origine dans un endroit sec et protégé des températures extrêmes (5 °C-35 °C). Tenir hors de la portée des enfants. Maintenir à l'écart des produits alimentaires, des boissons et de la nourriture des animaux. En cas de contact avec les yeux et la peau, laver immédiatement et avec de l'eau.

© Agroconsulting del Mediterráneo | Département technique | info@agroconsulting.es | + (00) 34 961 668 120 | Rev. 1 (21/01/16)