ACM-Boro

agro consulting del mediterráneo s.l.

E.1.1.1 (d) Bore Éthanolamine. Règlement (CE) nº 2003/2003 Engrais CE

CARACTÉRISTIQUES

ACM-Boro est un produit liquide formulé avec du bore, spécialement désigné pour prévenir et corriger les carences de cet élément.

Il est recommandé d'appliquer **ACM-Boro** avant l'apparition des symptômes de carence en bore, vue que ce type de carence apparaisse tardif.

Le produit est désigné pour une application foliaire; Ainsi et en fin d'obtenir les meilleurs résultats, il faut appliquer **ACM-Boro** quand la plante a une masse foliaire suffisante.

Produit utilisé dans l'agriculture biologique au titre du règlement (CE) n ° 834/2007: Certificat No. CM260PAE-07.2 par Sohiscert

DOSE D'APPLICATION



LÉGUMES

Dose:
1-2 litres/Ha, lorsque la plante a une masse foliaire suffisante.



BETTERAVES

Dose:
1,5-3 litres/Ha, lorsque la plante a une masse foliaire suffisante.



FRAISE

Dose:
1 litre/Ha, en bouton blanc et au début de la floraison.



FRUITS

Dose:
1-2 litres/Ha a l'ouverture des bourgeons, avant le début de la floraison et après la nouaison.



OLIVE

Dose:
2-3 litres/Ha en trois applications.



VIGNOBLE

Dose:
3-4 litres/Ha en trois applications.



TOURNESOL

Dose:
3-4 litres/Ha en deux applications.



LUZERNE

Dose:
1,5-3 litres/Ha lorsque la plante a une masse foliaire suffisante. Il est recommandé de diluer entre 100 a 400 cc. par 100 litres d'eau.

COMPOSITION
exprimés en % p./p.

Bore (B): 11%
pH: 7,5 - 8,5
Densité: 1,30 - 1,35 g/cm^3
Couleur: Jaune-Rose

ZÉRO RÉSIDU

PRÉCAUTIONS
Les recommandations et les informations que nous fournissons, sont le résultat des larges et rigoureux essais. Cependant, des nombreux facteurs peuvent influer sur notre contrôle l'heure de sa utilisation tel que la météo, la préparation des bouillons, les applications, etc. La société garantit la composition, la formulation et le contenu. Il est compatible avec la plupart des insecticides, des fongicides et des engrais. En cas de doute, effectuer un test de compatibilité. L'utilisateur est responsable des dommages causés pour manque d'efficacité, la toxicité, les déchets, etc. pour ne pas suivre les instructions de l'étiquette. Conserver dans un endroit sec et à l'abri des températures extrêmes (5 °C-35 °C). Tenir hors de la portée des enfants. Maintenir à l'écart de nourriture, des boissons et des aliments. En cas de contact avec les yeux et la peau, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau.

© Agroconsulting del Mediterráneo | Département technique | info@agroconsulting.es | + (00) 34 961 668 120 | Rev. 0 (19/02/14)